

抽脂

抽脂的原理


人體的脂肪細胞從出生開始就持續不斷的增加，在週歲左右脂肪的量占全身組織的百分之三十。到了青春期，脂肪細胞的數目已固定而不再增生，此後增加的是脂肪細胞的體積而不是數目。基於此種理論，被抽脂後的局部組織，它的脂肪細胞數目已明顯減少，因而有一定程度的效果。

激光抽脂是一種既安全又有效，創傷性小及復原快的局部除脂方法，來改善經體重控制及進行運動亦未能消除的局部多餘脂肪積聚，重塑美麗的身體曲線。

激光抽脂 (Laserlipolysis) 是一項革命創新性的微創抽脂技術，其原理是利用特別的激光能量(1064nm Nd:Yag Laser)，經極幼的光學纖維(1mm)，導入脂肪組織內，針對性的擊破脂肪細胞黏膜，令細胞爆裂以致內裏的脂肪溢出細胞以外，(所以又稱作激光溶脂手術)，再用幼管以低吸力即時抽出體外，或選擇不抽除而由身體經新陳代謝吸收。手術能達致局部除脂的效果，從而雕塑出完美身形。

優點：

1. 脂肪細胞被溶解掉後，原部位脂肪細胞數目不會再增加回來，因此原部位不會再復胖。
2. 雷射光能量將血管凝集，手術過程幾乎零出血
3. 雷射光能量刺激膠原蛋白收縮，手術後皮膚更為緊緻



抽指手術


手術主要分三部份：

首先手術前醫生會先在接受激光溶脂的部位畫上記號，確定位置，在治療部位皮下脂肪層注射麻醉藥。

然後，用極幼的激光纖維，像針注射一般刺入脂肪層，然後將激光纖維管在脂肪層內作扇形的來回移動以覆蓋所需治療的脂肪組織範圍，利用激光纖維末端發出的激光能量，擊破脂肪細胞黏膜而令內裏的脂肪溶化流出細胞外

最後，用幼管在低負壓下把溶化了的脂肪抽出體外，令除脂效果即時呈現

手術過程約需一至二小時。因為脂肪已經由激光溶化，所以相對比較容易用低壓抽出，而不是像傳統抽脂手術般用高負壓強行抽走，加上激光亦能凝固血管而有止血作用，所以手術後的疼痛及瘀腫亦比較輕微。



手術前和後



需注意的地方

1. 接受激光抽脂手術前後一星期，宜戒絕煙酒，有血凝固問題的人仕不宜接受手術
2. 手術前後一星期不能服食維生素 E 及亞士匹靈等藥物
3. 接受手術後的部位間有輕微瘀腫。
4. 手術後需視乎醫生的指示穿著壓力衣，加速消腫及令皮膚自然收緊
5. 手術後一星期內不能焗桑拿，浸熱水浴或沕泉及進行劇烈運動。
6. 激光抽脂後的完美效果將會在1至3個月內漸漸呈現。